

ATHERIS CERATOPHORA Werner, 1895 • **ATERIS ROHATÝ**

akva tera fórum

Čeďed: Viperidae (podčeďed Viperinae)

Řád: Squamata (šupinatí)

Výskyt: Afrika - endemit Tanzanie (pohoří Usambara, Uluguru a Udzungwa)

Velikost: 55 cm, samice jsou většší.

Pohlavní rozdíly: Samci mají silnější ocas za kloakou.

Chov a odchov: Jedinci aklimatizovaní a narození v chovu se spokojí se skromnými podmínkami. Terária krychlovitého tvaru větších rozměrů s vlhkým substrátem (rašelina, rašelíník, trouch apod.), větvemi a živými rostlinami. Teplota postačí pokojová (22-24 °C). Možný (ale ne nutný) je lokální zdroj tepla. Při regulování teploty mějme na paměti, že zmije žijí v horském pralesě (700–2200 m n.m.). Vlhkost udržujeme vyšší denním rosením vždy večer. Zmije je vhodné „zimovat“ při 10–15 °C od června do září (období klidu lze posunout i do evropské zimy). Poté dochází k páření (září až říjen). Až 10 měsíců po 5-7měsíční graviditě v březnu až květnu. Zmije většinou dobře přijímají hlodavce, ještěry, žáby i ptáky; je třeba dávat pozor na zdravotní problémy plynoucí z obezity.

Poznámky: Jako jediný druh rodu má tato zmije nad očima rohovitě šupiny, jejichž význam není znám. Ústknutí tímto druhem není člověku nebezpečné.

Tomáš Mazuch

