

CHAMAELEO (TRIOCEROS) NARRAIOCA Nečas, Modrý & Šlapeta, 2003 • CHAMELEON akva tera fórum

Čeleď: Chamaeleonidae (chameleonoviti), podčeleď Chamaeleoninae

Řád: Squamata (šupinatí)

Výskyt: Afrika - Mt. Kulal, severní Keňa; v nadmořských výškách nad 1700 m

Velikost: do 30 cm, většinou 15-22 cm

Pohlavní rozdíly: Samci mají silnější bázi ocasu, větší a delší nepravé rohy na hlavě a ve zbarvení jsou kontrastnější a barevnější.

Chov a odchov: Vzhledem k tomu, že tento chameleon byl teprve nedávno popsán, je údajů o jeho chovu a odchovu minimum. Podmínky chovu budou podobné zřejmě těm, jaké jsou u běžněji chovaných druhů – *Ch. (T.) hoehnelii* a *Ch. (T.) jacksonii*. V areálu rozšíření tohoto horského druhu chameleona jsou denní teploty 22-24 °C a noční 12-16 °C. Během roku se v oblasti jeho výskytu střídají období deště (listopad až prosinec a březen až květen) a sucha. Zdrojem vláhky mimo období deště jsou noční a ranní mlhy. Chameleoni žijí ve výškách 1,5-2,5 m na křovinách a stromech. Jsou vejcoživoroďi. Několik dnů staré mládě a gravidní samici jsem našel začátkem září. Častěji jsou však v přírodě (září) nacházeni samci.

Poznámky: Druhový název *narraioca* je fonetický přepis jména pro chameleona v řeči Samburu. Vzhledem je *Ch. (T.) narraioca* nejvíce podobný *Ch. (T.) hoehnelii*, od kterého se liší zejména nižším hrdelním hřebenem a anatomii hemipenisů. *Ch. (T.) narraioca* je extrémně ohroženým druhem, který žije pouze v reliktních zbytcích montánního mlžného pralesa na vrcholu hory Kulal v severní Keňi.

Tomáš Mazuch

