

ELAPSOIDEA NIGRA Günther, 1888 • KORÁLOVČÍK ČERNÝ

akva tera fórum

Čeľad: Elapidae (korálovcovití), podčeľad Bungarinae

Rád: Squamata (šupinatí)

Výskyt: Afrika – Tanzanie; pohoří Usambara, Uluguru, Magrotto a severní Pare 300-1900 m n.m. Možný výskyt je i v pohoří Udzungwa a pohoří Taita v Keni.

Velikost: 30-50 cm, maximálně 60 cm

Pohlavní rozdíly: Samci mají delší ocas a více subkauzálních šupin (nad 18).

Chov a odchov: Tento had se chová zřídka. Terarijní jedinci pocházejí z importů z pohoří Usambara v Tanzanii. Měl jsem možnost chovat po kratší čas pouze jedno mládě importované z pohoří Usambara. Mládě jsem umístil do plastové nádoby rozměrů 20x20x11 cm, se sterilním troudem a kousky mechu na dně. Udržoval jsem denním rosením vysokou vlhkost; teplotu přes den 25-26 °C, přes noc asi o 2-3 °C méně. Mláděti jsem nabízel jako potravu žížaly a holátka myši, ale bez úspěchu. Čerstvě narozené scinky *Trachylepis maculilabris* (dřívě *Mabuaya*) korálovčík přijímal s chutí. Pro případný chov tohoto druhu doporučuji méně temperovaná terária (22-26 °C) s vyšší vzdušnou vlhkostí. Problém by mohl nastat s krmením, protože téměř výhradní potravou hadů jsou v přírodě cecílie (beznozí obojživelníci). Odchov v teráriu se dosud nezdařil. Samice v přírodě kladou 2-5 vajec rozměrů 1x4 cm. V období října až prosince byly v přírodě chytány samice s vejci ve vejcovodech.

Poznámky: Účinek jedu na člověka není znám, předpokládá se, že není smrtelný. Had je mírné povahy, nesnaží se bránit kousáním. Je terestrický, aktivní v noci a přes den zahrabaný v podrostu.

Tomáš Mazuch

