

HOLODACTYLUS AFRICANUS Boettger, 1893

akva tera fórum

Čeľad: Gekkonidae (gekonoviti)

Řád: Squamata (šupinatí)

Výskyt: Afrika – východní a jižní část Etiopie, Somálsko, Keňa a severní Tanzanie

Velikost: 11 cm (celková délka)

Pohlavní rozdíly: Samci mají objemnější bázi ocasu v důsledku přítomnosti pářících orgánů.

Chov a odchov: Vhodná jsou středně velká terária se substrátem k vyhrabávání nor (písek smíchaný s hlínou nebo jílem), plochými kameny, trsy travin a kmínkem ze stromu nebo samorostem. Gekoni v přírodě většinou žijí v suché savaně (Somali–Masai *Acacia–Commiphora*) s červeným pískem, křovinnou vegetací a termiští. Termiti jsou hlavní potravou. V chovu podáváme cvrčky, smýkaný hmyz, mravence a moučné červy. Teplota 28–30 °C, vlhkost nízká, většinu substrátu udržujeme suchou, jeden roh terária vlhký. Miska s vodou by neměla chybět. Terárium je vhodné každý večer porosit. V období března až května a října až prosince (odpovídá období deštů) terárium více rosíme a udržujeme vlhčí (ale stále suché). O rozmnožení v chovech nemám žádné informace.

Poznámky: Tlustý ocásek slouží jako zásobárna tuku pro období sucha. Tito noční gekoni jsou neaktivnější v období deštů nebo po dešti. Někteří autoři zmiňují, že nevydrží v chovu dlouho bez typické potravy – termitů.

Tomáš Mazuch

