

## NAJA NIGRICOLLIS (Reinhardt, 1843) • KOBRA ČERNOKRKÁ

akva tera fórum

**Čeľad:** Elapidae (korálovcovití), podčeľad Bungarinae

**Řád:** Squamata (šupinatí)

**Výskyt:** subsaharská Afrika vyjma oblastí Konžsko-guinejské pánve a států Mozambik, Zimbabwe, Botswana a JAR

**Velikost:** 1,3–2 m, maximálně 2,7 m

**Pohlavní rozdíly:** Samci mají silnější ocas v oblasti hemipenisů.

**Chov a odchov:** Kobry černokrké patří mezi nejčastěji chované kobry v ČR. Dospělé hady chováme nejlépe jednotlivě v teráriích přibližných rozměrů 100x70x40 cm (dxhxv). Jako substrát se dobře osvědčil písek, písek smíchaný s rašelinou i papír. Kvůli bezpečnosti chovatele, ale i pro lepší manipulovatelnost s hadem, je dobré dát do terária uzavíratelnou bedýnku jako úkryt. Nezbytná je miska s vodou. Rostliny a další dekorace nejsou nutné. Denní teplota 25-32 °C, noční může být nepatrně nižší. Vzdušnou vlhkost udržujeme nižší, kolem 60 %. K páření dochází v zimě. Samice kladou 10-24 vajec v jarních měsících. Po 60-70 dnech při teplotě 28-30 °C se z nich líhnou mladé kobry dlouhé 20-25 cm. Mláďata stejně jako dospělí jedinci bezproblémově přijímají krmené hlodavce. Růst kober je rychlý, ve dvou letech mohou dosáhnout délky 150 cm.

**Poznámky:** Druh patří mezi plivající kobry. Pro člověka smrtelný jed může plivnout až do vzdálenosti 3 m. Nedávno se v rámci druhu *N. nigricollis* rozlišovaly poddruhy, které jsou dnes považovány za samostatné druhy *N. woodi* a *N. nigricincta*. Ze synonym *N. nigricollis* je vyčleňováno jako platné jméno *N. crawshayi* pro „černokrké“ kobry z oblasti od Angoly po Tanzanii.

Tomáš Mazuch

