

RHAMPHIOPHIS RUBROPUNCTATUS (Fischer, 1884)

akva tera fórum

Čeďed: Colubridae (užovkovití), podčeďed Psammophiinae

Řád: Squamata (šupinatí)

Výskyt: Afrika - jižní Súdán, Etiopie, Somálsko, Keňa, Tanzanie, 0-1200 m n.m.

Velikost: 1,4–2 m, maximálně 2,5 m

Pohlavní rozdily: Chybí informace. Samice mají pravděpodobně nižší počet ventrálních šupin.

Chov a odchov: Tento druh není prakticky chován a pravděpodobně ho dosud v teráriu nikdo nerozmnožil. Pro chov se hodí velká suchá terária. Jako substrát je nejvhodnější písek nebo jiný materiál, který zůstane suchý. Hadi žijí v přírodě často v norách po hlodavcích nebo v termištích, vhodnější je proto vyšší vrstva substrátu. Teploty doporučuji udržovat vyšší, přes den mezi 27–35 °C, přes noc 22-25 °C. Rosení není nutné, nebo jenom občas. V místech výskytu je patrné cyklické střídání tzv. období dešťů (říjen až listopad, březen až květen) a sucha. Jako úkryty jsou nejvhodnější ploché kameny nebo kusy borky. V přírodě žere tento druh hlodavce a veverky. Mláďata přijímají ještěrky. Mláďe mnou chované žralo s chutí myši. Z reprodukční biologie není nic známo, pravděpodobně klade vejce. Chov tohoto druhu je podobný chovu hadů rodu *Psammophis*.

Poznámky: Jde o typického obyvatele suché savany Acacia – Commiphora. Žije více podzemním způsobem života oproti příbuzným užovkám rodu *Psammophis* a patří mezi zřídka pozorované druhy. Patří mezi největší východoafrické hady se zadními jedovými zuby. V Keni je běžnější *R. rostratus*, v Somálsku *R. rubropunctatus*.

Tomáš Mazuch

