

RHAMPHOLEON BOULENGERI Steindachner, 1911 • CHAMELEÓNEK BOULENGERŮV

akva tera fórum

Čeleď: Chamaeleonidae (chameleónovití), podčeleď Brookesiinae

Řád: Squamata (šupinatí)

Výskyt: Afrika - východní část Demokratické republiky Kongo (provincie Oriental a Kivu), Rwanda, Burundi, Uganda a Keňa; 500-2000 m n.m.

Velikost: 5-7 cm, maximálně 8 cm

Pohlavní rozdíly: Samice mají slabší ocas, samci jednou tak silnější.

Chov a odchov: Chameleónek Boulengerův obývá deštný prales spíše v nižších nadmořských výškách. Je aktivní ve dne, kdy hledá potravu v podrostu do výšky asi 60 cm. V noci spí na bylinné vegetaci ve výšce 30 – 60 cm. Jako ochranné chování vyvinula vibrace, kterou někteří pozorovatelé popisují jako elektrický šok. Při dodržení určitých podmínek je nenáročný. Chameleónky můžeme chovat v menších teráriích (30x30x30 cm). Na dno dáme rašelinu, lépe hrabanku s listím nebo kůrou. Substrát udržujeme více vlhký. Důležité jsou větvičky, kůra nebo živé rostlinky pro lezení a úkryt. Teploty přes den 21-25 °C, přes noc trochu nižší. Rosíme ráno. Krmíme jakýmkoli hmyzem vhodné velikosti (cvrčci a smýkaný hmyz). Samice kladou 1-3 vejce dlouhé 1,2-1,5 cm. Mláďata se líhnou při teplotách 20-23 °C (noční 16-20 °C) za cca 180 dnů. V chovu se chameleónek se dožívá při dobré péči až 2,5 roku.

Poznámky: Tento druh patří nyní do podrodu *Rhinodigitum* (spolu s druhy *R. platiceps*, *R. nchisiensis*, *R. chapmanorum*, *R. uluguruensis* a *R. moyeri*). Suchomilné druhy (*R. kerstenii* a *R. brachyurus*) spolu s *R. brevicaudatus* patří do rodu *Rieppeleon*.

Tomáš Mazuch

